

INFORMATOR

o egzaminie ósmoklasisty z matematyki

od roku szkolnego 2024/2025
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących



Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa 2024

Zespół redakcyjny:

Monika Nowak (CKE)
Edyta Warzecha
Renata Świrko (OKE w Gdańsku)
Iwona Łuba (OKE w Łomży)
Sabina Pawłowska (OKE w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Semadeni
Agnieszka Sułowska
Katarzyna Pęczek
Józef Daniel
dr Marcin Smolik (CKE)

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Kajetana Maciejska-Roczan
dr Tomasz Karpowicz (recenzja językowa)

Informator został opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel. 22 536 65 00
sekretariat@cke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk
tel. 58 320 55 90
komisja@oke.gda.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno
tel. 32 784 16 00
sekretariat@oke.jaworzno.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
tel. 12 683 21 01
oke@oke.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

al. Legionów 9, 18-400 Łomża
tel. 86 473 71 20
sekretariat@oke.lomza.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź
tel. 42 664 80 50
sekretariat@lodz.oke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
tel. 61 854 01 60
sekretariat@oke.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa
tel. 22 457 03 35
info@oke.waw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 94
sekretariat@oke.wroc.pl

Spis treści

1.	Opis egzaminu ósmoklasisty z matematyki	5
	Wstęp	5
	Zadania na egzaminie	5
	Opis arkusza egzaminacyjnego	6
	Zasady oceniania	6
2.	Przykładowe zadania z rozwiązaniami	9

1.

Opis egzaminu ósmoklasisty z matematyki

WSTĘP

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w [podstawie programowej kształcenia ogólnego](#)¹.

Informator prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz wskazuje odniesienie zadań do wymagań podstawy programowej. Zadania w *Informatorze* nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z matematyki zapisanych w podstawie programowej. Dlatego *Informator* nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić odpowiednie wykształcenie matematyczne uczniów, w tym ich właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

ZADANIA NA EGZAMINIE

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdują się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski.

Wśród zadań otwartych znajdują się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania. Uczeń będzie musiał, wykorzystując posiadane wiadomości i umiejętności, wymyślić i zrealizować własny plan rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu. W niektórych zadaniach wymagane będzie przedstawienie uzasadnienia wskazanych zależności.

¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 996).

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego:

- sprawność rachunkowa
- wykorzystanie i tworzenie informacji
- wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
- rozumowanie i argumentacja.

OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut². W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 20 do 21 zadań. Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj zadań	Liczba zadań	Łączna liczba punktów	Udział w wyniku sumarycznym
zamknięte	14–15	14–15	ok. 50%
otwarte	5–6	15–16	ok. 50%
RAZEM	20–21	30	100%

W arkuszu egzaminacyjnym jako pierwsze zamieszczone będą zadania zamknięte, a po nich – zadania otwarte.

ZASADY OCENIANIA

Zadania zamknięte

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna (lub niepełna) albo brak odpowiedzi.

Zadania otwarte

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać, w zależności od jego złożoności, maksymalnie 2 lub 3 punkty. Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się maksymalną liczbę punktów, nawet jeżeli przedstawiony sposób rozwiązania nie został uwzględniony w zasadach oceniania.

Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania. Poniżej przedstawione zostały przykładowe zasady punktowania rozwiązań zadań otwartych.

² Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony w przypadku uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, zgodnie z *Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym.*

Zasady punktowania rozwiązania zadania, za które można otrzymać maksymalnie 3 punkty:

- 3 pkt – pełne rozwiązanie.
- 2 pkt – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędną metodą.
- 1 pkt – rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania.
- 0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Zasady punktowania rozwiązania zadania, za które można otrzymać maksymalnie 2 punkty:

- 2 pkt – pełne rozwiązanie.
- 1 pkt – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu.
- 0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

2.

Przykładowe zadania z rozwiązaniami

W *Informatorze* dla każdego zadania podano:

- liczbę punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie (po numerze zadania)
- najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu
- zasady oceniania rozwiązań zadań
- poprawne rozwiązanie każdego zadania zamkniętego oraz przykładowe pełne rozwiązania każdego zadania otwartego.

Zadanie 1. (0–1)

Stary zegar babci w czasie każdego kwadransa spóźnia się o 1 minutę.

Kasia ustawiła godzinę 9:00 na zegarze babci.

Którą godzinę pokaże zegar babci po 2 godzinach i 3 kwadransach od godziny 9:00, jeżeli zegar babci będzie się spóźniał o 1 minutę w czasie każdego kwadransa? Zaznacz dobrą odpowiedź.

A. 11:34

B. 11:37

C. 11:41

D. 11:56

Wymaganie ogólne

I. Sprawność rachunkowa.

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

A

Zadanie 2. (0–1)

Marta zapisała w systemie rzymskim cztery liczby: CLXX, CXC, CCLXX oraz CCL.

Która z nich jest na osi liczbowej najbliższej liczby 200? Zaznacz dobrą odpowiedź.

- A. CLXX B. CXC C. CCLXX D. CCL

Wymaganie ogólne

I. Sprawność rachunkowa.

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

I. Liczby naturalne w dziesiętkowym układzie pozycyjnym. Uczeń:

5) liczby w zakresie do 3000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiętkowym, a zapisane w systemie dziesiętkowym przedstawia w systemie rzymskim.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

B

Zadanie 3. (0–1)

Do trzech jednakowych naczyń wiano tyle wody, że w pierwszym naczyniu woda zajmowała $\frac{2}{3}$ pojemności, w drugim: $\frac{3}{4}$ pojemności, a w trzecim: $\frac{5}{7}$ pojemności danego naczynia.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W drugim naczyniu było mniej wody niż w trzecim naczyniu.	P	F
W pierwszym i drugim naczyniu razem było tyle samo wody, co w trzecim naczyniu.	P	F

Wymaganie ogólne

I. Sprawność rachunkowa.

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne).

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

FF

Zadanie 4. (0–1)

W każdej z dwóch torebek znajdują się 32 cukierki: 17 pomarańczowych, 10 jabłkowych i 5 truskawkowych.

Uzupełnij zdania. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź C albo D.

Do pierwszej torebki trzeba dodać

A	B
---	---

 cukierki truskawkowe, aby cukierki truskawkowe stanowiły 25% liczby wszystkich cukierków w tej torebce.

A. 3

B. 4

Trzeba wyjąć z drugiej torebki

C	D
---	---

 niż 5 cukierków pomarańczowych, aby wśród pozostałych w niej cukierków było 40% pomarańczowych.

C. mniej

D. więcej

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

V. Obliczenia procentowe. Uczeń:

5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach dwukrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

BD

Zadanie 5. (0–1)

Za 30 dag orzechów zapłacono 15,75 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Za 40 dag tych orzechów należy zapłacić 21 zł.	P	F
Cena 1 kg tych orzechów jest równa 52,50 zł.	P	F

Wymaganie ogólne

I. Sprawność rachunkowa.

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:

2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, np. wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

PP

Zadanie 6. (0–1)

Uzupełnij zdania. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź C albo D.

Wartość wyrażenia $2^3 \cdot 3^2$ jest równa

A	B
---	---

.

A. 36

B. 72

Wartość wyrażenia $5^3 - 5^2$ jest równa

C	D
---	---

.

C. 5

D. 100

Wymaganie ogólne

I. Sprawność rachunkowa.

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Wymagania szczegółowe

KLASY IV–VI

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

8) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;

9) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie


BD

Zadanie 7. (0–1)


Wojtek narysował cztery figury (I–IV) składające się z kwadratów i trójkątów równobocznych (zobacz rysunek). Wojtek chce dorysować do każdej figury jeden kwadrat albo jeden trójkąt, aby otrzymać z nich siatki graniastoslupa.




I



II



III



IV

Z której figury Wojtek nie otrzyma siatki graniastoslupa? Zaznacz dobrą odpowiedź.

A. I

B. II

C. III

D. IV

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

X. Bryły. Uczeń:

3) rozpoznaje siatki graniastoslupów prostych i ostrosłupów.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C

Zadanie 8. (0–1)

Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w rzucie tą kostką wypadnie liczba oczek większa od 2, ale mniejsza od 6? Zaznacz dobrą odpowiedź.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{5}{6}$

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

XII. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń:

2) przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościnną lub losowaniu kuli spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

B

Zadanie 9. (0–1)

Dane jest wyrażenie $\frac{2^7 \cdot 2^7}{2^7 + 2^7}$.

Czy wartość tego wyrażenia jest liczbą podzielną przez 8?

Zaznacz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

A.	Tak,	ponieważ	1.	każdy z wykładników jest liczbą <u>nieparzystą</u> .
			2.	wykładnik potęgi 2^6 <u>nie jest podzielny</u> przez 8.
B.	Nie,		3.	wartość tego wyrażenia można zapisać w postaci $8 \cdot 2^3$.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:

2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

A3

Zadanie 10. (0–1)

Witek ma trzy jednakowe klocki w kształcie prostopadłościanu. W każdym z tych klocków dwie ściany są kwadratami, a cztery pozostałe – prostokątami. Witek zbudował z tych klocków figurę przedstawioną na rysunku.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Dłuższe krawędzie (x) klocka mają po 8 cm.	P	F
Objętość jednego klocka jest równa 72 cm^3 .	P	F

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

6) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

PP

Zadanie 11. (0–1)

Do 450 ml soku dodano wodę w stosunku 1 : 10 i otrzymano napój.

Ile napoju otrzymano? Zaznacz dobrą odpowiedź.

- A. Więcej niż 4 litry, ale mniej niż 4,5 litra.
- B. Dokładnie 4,5 litra.
- C. Więcej niż 4,5 litra, ale mniej niż 5 litrów.
- D. Dokładnie 5 litrów.
- E. Więcej niż 5 litrów.

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:

2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej, np. wartość zakupionego towaru w zależności od liczby sztuk towaru.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C

Zadanie 12. (0–1)

Dane są trzy wyrażenia:

$$F = x - (2x + 5) \qquad G = 6 - (-3x + 2) \qquad H = 5 - (2x + 4)$$

Dokończ zdanie. Zaznacz dobrą odpowiedź.

Dla każdej wartości x prawdziwa jest równość

- A. $F + G = H$
- B. $F + H = G$
- C. $G + H = F$
- D. $F + G + H = 0$

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. Uczeń:

2) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, redukując wyrazy podobne.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

D

Zadanie 13. (0–1)

Zapisano sumę szesnastu jednakowych składników:

$$\underbrace{2 + 2 + 2 + \dots + 2}_{16 \text{ składników}}$$

Dokończ zdanie. Zaznacz dobrą odpowiedź.

Wartość tej sumy jest równa

A. 2^4

B. 2^5

C. 2^8

D. 2^{16}

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

I. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń:

1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

B

Informacje do zadań 14. i 15.

Mateusz mieszka w odległości 4 km od szkoły. Do przystanku autobusowego Mateusz idzie pieszo. Tam czeka na autobus, którym jedzie do szkoły. Pewnego dnia, gdy Mateusz był już na przystanku, przypomniał sobie, że nie zabrał zeszytu, dlatego wrócił do domu. Wykres przedstawia, jak tego dnia zmieniała się odległość Mateusza od domu w zależności od czasu.

**Zadanie 14. (0–1)**

Dokończ zdanie. Zaznacz dobrą odpowiedź.

Od momentu, gdy Mateusz po raz drugi wyszedł z domu, do momentu, gdy wsiadł do autobusu minęło

- A. 8 minut. B. 14 minut. C. 19 minut. D. 20 minut.

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

A

Zadanie 15. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Dom Mateusza znajduje się w odległości 400 m od przystanku autobusowego.	P	F
Autobus drogę między przystankami pokonał z prędkością $54 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.	P	F

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymagania szczegółowe

KLASY IV–VI

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki prędkości km/h i m/s.

KLASY VII i VIII

XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

PP

Zadanie 16. (0–1)

Dane są cztery liczby: $\sqrt{2}$, $\sqrt{8}$, $-\sqrt{10}$, $-\sqrt{18}$. Suma trzech z tych liczb jest równa 0.

Dokończ zdanie. Zaznacz dobrą odpowiedź.

Wartość równą 0 ma suma liczb

A. $\sqrt{8} + (-\sqrt{10}) + (-\sqrt{18})$

B. $\sqrt{2} + (-\sqrt{10}) + (-\sqrt{18})$

C. $\sqrt{2} + \sqrt{8} + (-\sqrt{18})$

D. $\sqrt{2} + \sqrt{8} + (-\sqrt{10})$

Wymaganie ogólne

I. Sprawność rachunkowa.

1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

II. Pierwiastki. Uczeń:

2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C

Zadanie 17. (0–1)

Na rysunku przedstawiono klocek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 8 cm, 7 cm i 3 cm oraz sposób, w jaki rozcięto go na cztery części: sześcián (I) i trzy prostopadłościany (II, III, IV).



Dokończ zdanie. Zaznacz dobrą odpowiedź.

Objętość prostopadłościanu II jest równa

- A. 27 cm^3 B. 36 cm^3 C. 45 cm^3 D. 60 cm^3

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

6) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

B

Zadanie 18. (0–1)

Na przedstawienie można kupić bilety normalne w jednakowej cenie oraz bilety ulgowe o 50% tańsze niż bilety normalne. Pani Anna za 3 bilety normalne i 2 bilety ulgowe zapłaciła 120 złotych. Na to samo przedstawienie pan Jacek kupił 2 bilety normalne i 3 ulgowe.

Uzupełnij zdania. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź C albo D.

Pan Jacek zapłacił za bilety

A	B
---	---

.

A. 120 zł B. 105 zł

Pani Anna zapłaciła za bilety o

C	D
---	---

 więcej niż pan Jacek.

C. 15 zł D. 30 zł

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

BC

Zadanie 19. (0–1)

Na diagramie przedstawiono wielkość produkcji krzesel w pewnej firmie w 2015 r. i 2016 r.



Czy liczba wyprodukowanych krzesel w roku 2016 była o 100% większa od liczby wyprodukowanych krzesel w roku 2015? Zaznacz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

A.	Tak,	ponieważ	1.	drugi słupek na wykresie jest <u>2 razy wyższy</u> od pierwszego.
			2.	liczba krzesel wyprodukowanych w 2016 roku jest o <u>40% większa</u> niż liczba krzesel wyprodukowanych w 2015 roku.
B.	Nie,		3.	w roku 2016 wyprodukowano o 100 krzesel <u>więcej niż</u> w roku 2015.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.

Wymagania szczegółowe

KLASY VII i VIII

V. Obliczenia procentowe. Uczeń:

5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach dwukrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.

XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. Uczeń:

1) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów, w tym także wykresów w układzie współrzędnych.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

B2

Zadanie 20. (0–1)

Na rysunku przedstawiono kwadraty $ABCD$, $EAOD$ i $BFCO$. Punkt O jest punktem przecięcia przekątnych kwadratu $ABCD$.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pole kwadratu $ABCD$ jest równe sumie pól kwadratów $EAOD$ i $BFCO$.	P	F
Obwód kwadratu $EAOD$ jest równy obwodowi kwadratu $BFCO$.	P	F

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

IX. Wielokąty, koła i okręgi. Uczeń:

5) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowoosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

PP

Zadanie 21. (0–1)

Drewnianą kostkę sześcienną o krawędzi długości 30 cm rozcięto na 27 jednakowych mniejszych sześciennych kostek. Z ośmiu takich małych kostek ułożono mniejszy sześcian.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pole powierzchni mniejszego sześcianu jest równe 4800 cm^2 .	P	F
Objętość mniejszego sześcianu jest równa 8000 cm^3 .	P	F

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

6) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.


0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

FP

Zadanie 22. (0–1)

Na okręgu o środku w punkcie S zaznaczono punkty A , B , C , D oraz narysowano odcinki AB , BD , DC oraz CS (zobacz rysunek).



Uzupełnij zdania. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź C albo D.

Trójkąt DCS

A	B
---	---

 równoramienny.

A. jest

B. nie jest

Długość odcinka DB jest równa

C	D
---	---

.

C. sumie długości odcinków DS i CS ($DS + CS$)

D. długości odcinka AB

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.

Wymagania szczegółowe

KLASY IV–VI

IX. Wielokąty, koła i okręgi. Uczeń:

1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne;

6) wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę oraz promień koła i okręgu.

Zasady oceniania

1 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

AC

Zadanie 23. (0–2)

1 września i 1 grudnia 2026 roku będą we wtorek. Uzasadnij, że pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku wypadają w tym samym dniu tygodnia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

4) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach.

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: sformułowanie poprawnego uzasadnienia, że pierwszy września i pierwszy grudnia tego samego roku wypadają w tym samym dniu tygodnia.

1 pkt – zapisanie, że od 1 września do 1 grudnia mija 91 dni

LUB

zapisanie, że 1 grudnia wypada w tym samym, wybranym dniu tygodnia, co 1 września.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania**I sposób**

wrzesień	30 dni
październik	31 dni
listopad	30 dni
Razem:	91 dni

$$91 : 7 = 13$$

Od 1 września do 1 grudnia mija równo 13 tygodni, więc 1 września wypada w tym samym dniu tygodnia, co 1 grudnia.

II sposób

Założmy, że 1 września wypada we wtorek, zatem kolejne wtorki to: 8, 15, 22 i 29 września, 6, 13, 20 i 27 października, 3, 10, 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia.

Wynika stąd, że 1 września i 1 grudnia wypadają w tym samym dniu tygodnia. Tak samo jest, gdy 1 września wypada w sobotę, w niedzielę itd. – zawsze 1 grudnia przypada w tym samym dniu tygodnia, co 1 września.

Zadanie 24. (0–3)

W tabeli podano wybrane informacje na temat dwóch rodzajów herbat, które pije rodzina Nowaków.

Rodzaj opakowania	Zawartość jednego opakowania	Cena jednego opakowania	Ilość herbaty potrzebna do przygotowania <u>jednego kubka</u> naparu
herbata w torebkach	50 torebek	8,50 zł	1 torebka
herbata sypka	50 g	5,00 zł	2 g

Rodzina ta wypija dziennie średnio 12 kubków herbaty i zamierza kupić możliwie najmniejszą liczbę opakowań herbaty jednego rodzaju, aby wystarczyło jej na 30 dni.

Oblicz koszt zakupu herbaty w torebkach oraz koszt zakupu herbaty sypkiej. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XIV. Zadania tekstowe. Uczeń:

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia kosztu zakupu obu rodzajów herbaty na 30 dni, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (herbata w torebkach: 68 zł, herbata sypka: 75 zł).

2 pkt – poprawny sposób obliczenia kosztu zakupu herbaty w torebkach **oraz** herbaty sypkiej na 30 dni

LUB

obliczenie kosztu zakupu herbaty w torebkach na 30 dni (68 zł),

LUB

obliczenie kosztu zakupu herbaty sypkiej na 30 dni (75 zł).

1 pkt – poprawny sposób obliczenia liczby opakowań jednego rodzaju herbaty na 30 dni.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Rodzina Nowaków wypija dziennie średnio 12 kubków herbaty.

Do zaparzenia jednego kubka naparu potrzeba jednej torebki herbaty.

Obliczmy, ile torebek herbaty potrzeba na 30 dni:

$$1 \text{ dzień} — 12 \text{ torebek}$$

$$30 \text{ dni} — 360 \text{ torebek}$$

W jednym opakowaniu jest 50 torebek herbaty. Obliczmy, ile opakowań herbaty w torebkach należy kupić:

$$360 : 50 = 7,2$$

Trzeba kupić 8 opakowań herbaty w torebkach. Obliczmy koszt zakupu 8 opakowań tej herbaty:

$$8 \cdot 8,50 = 68 \text{ (zł)}$$

Do zaparzenia jednego kubka naparu potrzeba 2 g herbaty sypkiej.

Obliczmy, ile gramów herbaty sypkiej potrzeba na 30 dni:

$$1 \text{ dzień} — 12 \cdot 2 \text{ g} = 24 \text{ g}$$

$$30 \text{ dni} — 30 \cdot 24 \text{ g} = 720 \text{ g}$$

W jednym opakowaniu jest 50 g herbaty sypkiej. Obliczmy, ile opakowań herbaty sypkiej należy kupić:

$$720 : 50 = 14 \text{ reszta } 20$$

Trzeba kupić 15 opakowań herbaty sypkiej. Obliczmy koszt zakupu 15 opakowań tej herbaty:

$$15 \cdot 5 = 75 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.

II sposób

Herbata w torebkach:

12 torebek herbaty wystarczy na 1 dzień

1 opakowanie to 50 torebek – wystarczy na 4 dni i zostają jeszcze 2 torebki

$6 \cdot 4 \text{ dni} = 24 \text{ dni}$ i $6 \cdot 2 \text{ torebki} = 12 \text{ torebek}$ (1 dzień)

Na 25 dni trzeba kupić 6 opakowań.

Na kolejne 5 dni potrzebne są jeszcze 2 opakowania.

Na 30 dni trzeba kupić 8 opakowań.

$$8 \cdot 8,50 = 68 \text{ (zł)}$$

Herbata sypka:

1 dzień — $12 \cdot 2 \text{ g} = 24 \text{ g}$

1 opakowanie zawiera 50 g, co wystarczy na 2 dni i zostają 2 gramy

15 opakowań — 30 dni i jeszcze zostaje 30 g

14 opakowań — 29 dni i 4 g

Brakuje 20 g, zatem trzeba kupić 15 opakowań.

$$15 \cdot 5 = 75 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.

III sposób

Herbata w torebkach:

1 dzień — 12 torebek

30 dni — 360 torebek

$$360 : 50 = 7 \text{ reszta } 10$$

Na 30 dni trzeba zatem kupić 8 opakowań.

$$8 \cdot 8,50 = 68 \text{ (zł)}$$

Herbata sypka:

1 dzień — 12 herbat

30 dni — 360 herbat

1 dzień — $12 \cdot 2 \text{ g} = 24 \text{ g}$

$50 \text{ g} : 2 = 25 \text{ g}$ — jedno opakowanie herbaty sypanej wystarczy na 25 herbat

$$360 : 25 = 14 \text{ reszta } 10$$

Trzeba kupić 15 opakowań.

$$15 \cdot 5 = 75 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.

IV sposób

Herbata w torebkach:

12 torebek potrzeba na 1 dzień

$$30 \cdot 12 = 360 \text{ — liczba torebek herbaty potrzebnej na 30 dni}$$

1 opakowanie zawiera 50 torebek herbaty

$$7 \cdot 50 = 350 \text{ torebek herbaty — za mało na 30 dni}$$

$$8 \cdot 50 = 400 \text{ torebek herbaty — wystarczy na 30 dni}$$

Trzeba kupić 8 opakowań tej herbaty.

$$8 \cdot 8,50 = 68 \text{ (zł)}$$

Herbata sypka:

1 dzień — $12 \cdot 2 \text{ g} = 24 \text{ g}$

$$30 \cdot 24 \text{ g} = 720 \text{ g — liczba gramów herbaty potrzebnej na 30 dni}$$

$$14 \cdot 50 = 700 \text{ g — za mało na 30 dni}$$

$$15 \cdot 50 = 750 \text{ g — wystarczy na 30 dni}$$

Trzeba kupić 15 opakowań tej herbaty.

$$15 \cdot 5 \text{ zł} = 75 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.

V sposób

Herbata w torebkach:

$$8,50 : 50 = 0,17 \text{ zł/1 torebkę}$$

$$0,17 \cdot 30 \cdot 12 = 61,20 \text{ (zł)}$$

$$61,20 : 8,50 = 7,2$$

Na 30 dni trzeba kupić 8 opakowań.

$$8 \cdot 8,50 = 68 \text{ (zł)}$$

Herbata sypka:

$$5 : 50 = 0,10 \text{ zł/1 g}$$

$$0,10 \cdot 30 \cdot 12 \cdot 2 = 72 \text{ (zł)}$$

$$72 : 5 = 14,4$$

Na 30 dni trzeba kupić 15 opakowań.

$$15 \cdot 5 \text{ zł} = 75 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.

VI sposób

Herbata w torebkach:

na 1 dzień potrzeba 12 torebek, zatem na 30 dni wystarcza 360 torebek

$$360 - 50 = 310 \text{ — 1. opakowanie}$$

$$310 - 50 = 260 \text{ — 2. opakowanie}$$

$$260 - 50 = 210 \text{ — 3. opakowanie}$$

$$210 - 50 = 160 \text{ — 4. opakowanie}$$

$$160 - 50 = 110 \text{ — 5. opakowanie}$$

$$110 - 50 = 60 \text{ — 6. opakowanie}$$

$$60 - 50 = 10 \text{ — 7. opakowanie}$$

$$10 \text{ — 8. opakowanie}$$

$$8 \cdot 8,50 = 68 \text{ (zł)}$$

Herbata sypka:

na 1 dzień potrzeba $12 \cdot 2 \text{ g} = 24 \text{ g}$, zatem na 30 dni: $30 \cdot 24 \text{ g} = 720 \text{ g}$

$$720 - 50 = 670 \text{ — 1. opakowanie}$$

$$670 - 50 = 620 \text{ — 2. opakowanie}$$

$$620 - 50 = 570 \text{ — 3. opakowanie}$$

$$570 - 50 = 520 \text{ — 4. opakowanie}$$

$$520 - 50 = 470 \text{ — 5. opakowanie}$$

$$470 - 50 = 420 \text{ — 6. opakowanie}$$

$$420 - 50 = 370 \text{ — 7. opakowanie}$$

$$370 - 50 = 320 \text{ — 8. opakowanie}$$

$$320 - 50 = 270 \text{ — 9. opakowanie}$$

$$270 - 50 = 220 \text{ — 10. opakowanie}$$

$$220 - 50 = 170 \text{ — 11. opakowanie}$$

$$170 - 50 = 120 \text{ — 12. opakowanie}$$

$$120 - 50 = 70 \text{ — 13. opakowanie}$$

$$70 - 50 = 20 \text{ — 14. opakowanie}$$

$$20 \text{ — 15. opakowanie}$$

$$15 \cdot 5 \text{ zł} = 75 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Za herbatę w torebkach trzeba zapłacić 68 zł, a za herbatę sypką 75 zł.

Zadanie 25. (0–2)

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek KM , taki że : $K = (-2, 8)$ oraz $M = (4, 6)$. Punkt P jest środkiem odcinka KM .

Oblicz współrzędne (x, y) punktu P . Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. Uczeń:

4) znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek.

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia współrzędnych (x, y) punktu P , prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy $(1, 7)$.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia współrzędnych (x, y) punktu P
LUB

poprawny sposób obliczenia jednej współrzędnej **oraz** prawidłowy wynik liczbowy $x = 1$ albo $y = 7$.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązanie

Punkt $P = (x, y)$ jest środkiem odcinka KM .

$$x = \frac{-2 + 4}{2} \qquad y = \frac{8 + 6}{2}$$

$$x = 1 \qquad y = 7$$

$$P = (1, 7)$$

Odpowiedź: Punkt P ma współrzędne $(1, 7)$.

Zadanie 26. (0–2)

W tabeli przedstawiono ceny kupna i sprzedaży dwóch walut w tym samym kantorze.

	Kupno	Sprzedaż
1 dolar	4,18 zł	4,25 zł
1 funt brytyjski	5,10 zł	5,22 zł

Marcin chce wymienić 400 funtów brytyjskich na dolary. Najpierw musi wymienić funty na złotówki, a potem – za otrzymane złotówki kupić dolary.

Oblicz, ile dolarów otrzyma Marcin w tym kantorze. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XIV. Zadania tekstowe. Uczeń:

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia kwoty (w dolarach), jaką Marcin otrzyma w kantorze, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (480).

1 pkt – poprawny sposób obliczenia kwoty (w złotych), za jaką kantor zakupił 400 funtów brytyjskich

LUB

poprawny sposób obliczenia kwoty (w dolarach), jaką Marcin otrzyma za jednego funta brytyjskiego.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Kantor kupuje od Marcina 1 funt brytyjski za 5,10 zł.

Obliczmy, ile złotych otrzyma Marcin za 400 funtów brytyjskich:

$$400 \cdot 5,10 = 2040 \text{ (zł)}$$

Kantor sprzedaje Marcinowi dolary po 4,25 zł za 1 dolar.

Obliczmy, ile dolarów otrzyma Marcin za 2040 złotych:

$$2040 : 4,25 = 480$$

Odpowiedź: Za 400 funtów brytyjskich Marcin otrzyma 480 dolarów.

II sposób

Kantor kupuje od Marcina 1 funt brytyjski za 5,10 zł, a sprzedaje mu dolary każdy po 4,25 zł.

Obliczmy, ile dolarów otrzyma Marcin za jednego funta:

$$5,10 : 4,25 = 1,20$$

Za każdego funta Marcin otrzymuje 1,20 dolara.


Obliczmy, ile dolarów otrzyma Marcin za 400 funtów

$$400 \cdot 1,20 = 480$$

Odpowiedź: Za 400 funtów brytyjskich Marcin otrzyma 480 dolarów.

Zadanie 27. (0–2)

Bok CD kwadratu $ABCD$ podzielono punktami E i F na trzy odcinki równej długości. Przez wierzchołek A kwadratu i przez punkt E poprowadzono prostą (zobacz rysunek). Pole trójkąta AED jest równe 24 cm^2 .



Oblicz pole kwadratu $ABCD$. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

3) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek.

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia pola kwadratu $ABCD$, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką (144 cm^2).

1 pkt – zapisanie, że pole kwadratu jest 6 razy większe od pola trójkąta AED ,

LUB

zapisanie, że pole połowy kwadratu jest 3 razy większe od pola trójkąta AED ,

LUB

obliczenie długości jednej z przyprostokątnych trójkąta AED .

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania


I sposób

Zauważymy, że kwadrat $ABCD$ można podzielić na 6 trójkątów przystających do trójkąta AED .

Obliczymy pole kwadratu $ABCD$:

$$P = 6 \cdot 24 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole kwadratu $ABCD$ jest równe 144 cm^2 .




II sposób

Zauważymy, że trójkąt AED ma pole 3 razy mniejsze od pola połowy kwadratu. Jest zatem 6 razy mniejsze od pola kwadratu $ABCD$.

$$P = 6 \cdot 24 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole kwadratu $ABCD$ jest równe 144 cm^2 .



III sposób

Oznaczmy długość boku DE trójkąta jako a . Wtedy bok AD trójkąta ma długość $3a$. Zapiszemy i rozwiążemy równanie, korzystając ze wzoru na pole trójkąta:

$$24 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 3a$$

$$3a^2 = 48$$

$$a = 4$$

$$3a = 3 \cdot 4 = 12$$

$$P = 12^2 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole kwadratu $ABCD$ jest równe 144 cm^2 .

IV sposób

Oznaczmy długość boku AD trójkąta jako x . Wtedy bok DE trójkąta ma długość $\frac{1}{3}x$. Zapiszemy i rozwiążemy równanie, korzystając ze wzoru na pole trójkąta:

$$24 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}x \cdot x$$

$$\frac{1}{6}x^2 = 24$$

$$x = 12$$

$$P = 12^2 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole kwadratu $ABCD$ jest równe 144 cm^2 .

Zadanie 28. (0–3)

W pierwszym zbiorniku było cztery razy więcej litrów wody niż w drugim. Do każdego zbiornika dodano po 6 litrów wody. Teraz w pierwszym zbiorniku jest dwa razy więcej litrów wody niż w drugim zbiorniku.

Oblicz, ile razem litrów wody jest teraz w obu zbiornikach. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia łącznej liczby litrów wody w obu zbiornikach, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką (27 litrów).

2 pkt – poprawny sposób obliczenia liczby litrów wody w pierwszym i drugim zbiorniku po dodaniu do każdego zbiornika po 6 litrów wody.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia początkowej liczby litrów wody w pierwszym zbiorniku
LUB

poprawny sposób obliczenia początkowej liczby litrów wody w drugim zbiorniku.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Oznaczmy początkową objętość wody (w litrach) w drugim zbiorniku jako x oraz

początkową objętość wody (w litrach) w pierwszym zbiorniku jako $4x$.

Obliczymy, ile litrów wody było na początku w drugim zbiorniku. Zapiszemy i rozwiążemy równanie:

$$4x + 6 = 2(x + 6)$$

$$4x + 6 = 2x + 12$$

$$x = 3$$

W drugim zbiorniku były na początku 3 litry wody.

W pierwszym zbiorniku było na początku $4 \cdot 3 = 12$ litrów wody.

Obliczymy, ile litrów wody było po wlaniu do każdego zbiornika po 6 litrów wody:

w pierwszym zbiorniku:

$$12 + 6 = 18 \text{ (litrów)}$$

w drugim zbiorniku:

$$3 + 6 = 9 \text{ (litrów)}$$

Obliczymy, ile litrów wody jest razem w obu zbiornikach:

$$18 + 9 = 27$$

Odpowiedź: W obu zbiornikach jest razem 27 litrów wody.

II sposób

Oznaczmy początkową objętość wody (w litrach) w pierwszym zbiorniku jako x oraz

początkową objętość wody (w litrach) w drugim zbiorniku jako $\frac{1}{4}x$.

Zapiszemy i rozwiążemy równanie:

$$x + 6 = 2 \left(\frac{1}{4}x + 6 \right)$$

$$x + 6 = \frac{1}{2}x + 12$$

$$\frac{1}{2}x = 6$$

$$x = 12$$

W pierwszym zbiorniku było na początku 12 litrów wody, a w drugim były $\frac{1}{4} \cdot 12 = 3$ litry wody. Zatem po wlaniu po 6 litrów wody:

– w pierwszym zbiorniku jest $12 + 6 = 18$ (litrów)


– w drugim zbiorniku jest $3 + 6 = 9$ (litrów)

Razem w obu zbiornikach jest $18 + 9 = 27$ (litrów)

Odpowiedź: W obu zbiornikach jest razem 27 litrów wody.

Zadanie 29. (0–3)

Prostokąt $ABCD$ podzielono na 6 kwadratów: 1 duży, 2 średnie i 3 małe (zobacz rysunek). Najmniejszy kwadrat ma pole równe 4 cm^2 .



Oblicz pole prostokąta $ABCD$. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

IX. Wielokąty. Uczeń:

3) stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków [...].

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia pola prostokąta $ABCD$, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką (66 cm^2).

2 pkt – poprawny sposób obliczenia pola prostokąta $ABCD$.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia długości boku dużego kwadratu

LUB

poprawny sposób obliczenia długości boku średniego kwadratu.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Jeśli długość boku małego kwadratu oznaczymy jako a , to duży kwadrat ma bok długości $3a$, a średni ma bok długości $1,5a$.

Pole małego kwadratu P_m jest równe 4 cm^2 .

Obliczymy długość boku małego kwadratu:

$$P_m = a^2 = 4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$a = 2 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość boku dużego kwadratu:

$$3a = 3 \cdot 2 = 6 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość boku średniego kwadratu:

$$1,5a = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość boku AB prostokąta $ABCD$:


$$|AB| = 1,5a + 3a + a$$

$$|AB| = 3 + 6 + 2 = 11 \text{ (cm)}$$

Obliczymy pole prostokąta $ABCD$:

$$P_{ABCD} = 11 \cdot 6 = 66 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole prostokąta $ABCD$ jest równe 66 cm^2 .



II sposób

Oznaczmy:

a długość boku małego kwadratu

$3a$ długość boku dużego kwadratu

$1,5a$ długość boku średniego kwadratu

Pole małego kwadratu P_m jest równe 4 cm^2 .

Obliczymy długość boku małego kwadratu:

$$P_m = a^2 = 4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$a = 2 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość boku AB prostokąta $ABCD$:


$$|AB| = 1,5a + 3a + a = 5,5a$$

$$|AB| = 5,5 \cdot 2 = 11 \text{ (cm)}$$

Obliczymy pole prostokąta $ABCD$:

$$P_{ABCD} = 11 \cdot 6 = 66 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole prostokąta $ABCD$ jest równe 66 cm^2 .



II sposób

Oznaczmy:

a długość boku małego kwadratu

$3a$ długość boku dużego kwadratu

$1,5a$ długość boku średniego kwadratu

Pole małego kwadratu P_m jest równe 4 cm^2 .

Obliczymy długość boku małego kwadratu:

$$P_m = a^2 = 4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$a = 2 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość boku dużego kwadratu i pole tego kwadratu P_d :

$$3a = 3 \cdot 2 = 6 \text{ (cm)}$$

$$P_d = 6^2 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Obliczymy długość boku średniego kwadratu i pole tego kwadratu P_{sr} :

$$1,5a = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ (cm)}$$

$$P_{sr} = 3^2 = 9 \text{ (cm}^2\text{)}$$


Obliczymy pole prostokąta $ABCD$ sumując pola sześciu kwadratów:

$$P_{ABCD} = 3 \cdot P_m + 2 \cdot P_{sr} + P_d$$

$$P_{ABCD} = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 9 + 36$$

$$P_{ABCD} = 12 + 18 + 36 = 66 \text{ (cm}^2\text{)}$$


Odpowiedź: Pole prostokąta $ABCD$ jest równe 66 cm^2 .




Zadanie 30. (0–3)

Na rysunku 1. przedstawiono kwadrat o polu równym 36 cm^2 . Kwadrat ten pocięto na 4 części, w sposób pokazany na rysunku 2. Z tych części zbudowano prostokąt, jak pokazano na rysunku 3.


Rysunek 1.



Rysunek 2.



Rysunek 3.



Oblicz obwód zbudowanego prostokąta. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.

Wymagania szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

2) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;

3) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia obwodu zbudowanego prostokąta, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką długości (40 cm).

2 pkt – poprawny sposób obliczenia długości boków prostokąta

LUB

obliczenie wymiarów 4 części (2 prostokątów i 2 trapezów), na które pocięto kwadrat.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia długości boku kwadratu.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania


I sposób

Obliczymy długość boku kwadratu:

$$\sqrt{36} = 6 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość krótszego boku prostokąta:

$$6 : 3 = 2 \text{ (cm)}$$



Pole prostokąta jest równe polu kwadratu, obliczymy długość dłuższego boku prostokąta:

$$36 : 2 = 18 \text{ (cm)}$$

Obliczymy obwód zbudowanego prostokąta:

$$2 \cdot 2 + 2 \cdot 18 = 40 \text{ (cm)}$$

Odpowiedź: Obwód zbudowanego prostokąta jest równy 40 cm.


II sposób

Obliczymy długość boku kwadratu:

$$\sqrt{36} = 6 \text{ (cm)}$$

Obliczymy długość krótszego boku prostokąta:

$$6 : 3 = 2 \text{ (cm)}$$




Długość dłuższej podstawy trapezu jest równa długości boku kwadratu, czyli 6 cm.

Obliczymy długość krótszej podstawy trapezu:

$$6 - 2 = 4 \text{ (cm)}$$

Długość drugiego boku mniejszego prostokąta jest równa długości krótszej podstawy trapezu, czyli 4 cm.



Obliczymy długość zbudowanego prostokąta:

$$4 + 6 + 4 + 4 = 18 \text{ (cm)}$$

Obliczymy obwód zbudowanego prostokąta:

$$2 \cdot 2 + 2 \cdot 18 = 40 \text{ (cm)}$$

Odpowiedź: Obwód zbudowanego prostokąta jest równy 40 cm.

Zadanie 31. (0–3)

Trzy sąsiadki zamówiły razem kawę w sklepie internetowym. Kawa dla pani Malinowskiej miała cenę 120 zł, a dla pani Wiśniewskiej i dla pani Śliwińskiej – po 90 zł. Przy zakupie otrzymały rabat (obniżkę) i za zamówioną kawę zapłaciły 260 zł.

Oblicz, ile pieniędzy powinna zapłacić każda z pań, aby jej wpłata była proporcjonalna do wartości zamówienia. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

VII. Proporcjonalność prosta. Uczeń:

3) stosuje podział proporcjonalny.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia kwot, które powinny zapłacić panie Malinowska, Wiśniewska i Śliwińska proporcjonalnie do pierwotnej wartości zamówienia, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (p. Malinowska: 104 zł, p. Śliwińska: 78 zł, p. Wiśniewska: 78 zł).

2 pkt – poprawny sposób obliczenia kwot, które powinna zapłacić każda z sąsiadek.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia, jaką częścią pierwotnej wartości zamówienia jest kawa

zamówiona dla jednej z sąsiadek, np. zapisanie $\frac{120}{300} = \frac{4}{10}$

LUB

poprawny sposób wyznaczenia stosunku wartości zamówień, np. zapisanie

4 : 3 : 3,

LUB

poprawny sposób wyznaczenia stosunku należności po rabacie do pierwotnej

wartości zamówienia, np. zapisanie $\frac{260}{300} = \frac{13}{15}$,

LUB

poprawny sposób wyznaczenia stosunku rabatu do pierwotnej wartości zamówienia,

np. zapisanie $\frac{40}{300} = \frac{2}{15}$.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Wartość zamówienia przed obniżką to 300 zł.

Koszt kawy pani Malinowskiej stanowi:

$$\frac{120}{300} = \frac{4}{10} \text{ tej kwoty}$$

Obliczymy kwotę do zapłaty przez panią Malinowską:

$$\frac{4}{10} \cdot 260 \text{ zł} = 104 \text{ (zł)}$$

Obliczymy kwotę do zapłaty przez panie Wiśniewską i Śliwińską:

$$260 \text{ zł} - 104 \text{ zł} = 156 \text{ (zł)}$$

Obliczymy kwotę do zapłaty przez każdą z pań: Wiśniewską oraz Śliwińską:

$$156 : 2 = 78 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska po 78 zł.

II sposób

Obliczymy stosunek wartości zamówień przed obniżką:

$$120 : 90 : 90 = 4 : 3 : 3$$

$$4 + 3 + 3 = 10$$

$$260 \text{ zł} : 10 = 26 \text{ (zł)}$$

Obliczymy kwotę do zapłaty przez panią Malinowską:

$$4 \cdot 26 \text{ zł} = 104 \text{ (zł)}$$

Obliczymy kwotę do zapłaty przez każdą z pań: Wiśniewską oraz Śliwińską:

$$3 \cdot 26 \text{ zł} = 78 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska po 78 zł.

III sposób

Wartość zamówienia przed obniżką to 300 zł. Sąsiadki zapłaciły za zamówioną kawę 260 zł.

$$\frac{260}{300} = \frac{13}{15}$$

Każda z pań powinna zapłacić $\frac{13}{15}$ wartości swojego zamówienia przed obniżką.

Obliczymy kwotę do zapłaty przez panią Malinowską:

$$\frac{13}{15} \cdot 120 = 13 \cdot 18 = 104 \text{ (zł)}$$

Obliczymy kwotę do zapłaty przez panie Wiśniewską i Śliwińską:

$$\frac{13}{15} \cdot 90 = 13 \cdot 6 = 78 \text{ (zł)}$$

Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska po 78 zł.

IV sposób

Pierwotna wartość zamówienia to 300 zł. Sąsiadki zapłaciły za zamówioną kawę 260 zł, zatem kwota rabatu jest równa 40 zł.

$$\frac{40}{300} = \frac{2}{15}$$

Każda z pań powinna zapłacić o $\frac{2}{15}$ pieniędzy mniej niż zakładano pierwotnie.

Obliczymy kwotę rabatu i kwotę do zapłaty przez panią Malinowską:

$$\frac{2}{15} \cdot 120 = 2 \cdot 8 = 16 \text{ (zł)}$$

$$120 - 16 = 104 \text{ (zł)}$$

Obliczymy kwotę rabatu i kwotę do zapłaty przez panie Wiśniewską i Śliwińską:

$$\frac{2}{15} \cdot 90 = 2 \cdot 6 = 12 \text{ (zł)}$$

$$90 - 12 = 78 \text{ (zł)}$$


Odpowiedź: Pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a panie Wiśniewska i Śliwińska po 78 zł.

Zadanie 32. (0–2)

Proste a i b są równoległe.

Półprosta PA przecina prostą a w punkcie A i tworzy z nią kąt ostry o mierze 27° .

Półprosta PB przecina prostą b w punkcie B i tworzy z nią kąt ostry o mierze 63° (zobacz rysunek).



Oblicz miarę kąta APB . Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.

Wymaganie szczegółowe

KLASY VII i VIII

VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń:

3) korzysta z własności prostych równoległych, w szczególności stosuje równość kątów odpowiadających i naprzemianległych.

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia miary kąta APB , prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (90°).

1 pkt – poprowadzenie prostej c **oraz** zapisanie poprawnej miary co najmniej jednego kąta odpowiadającego do 27° lub 63°

LUB

poprowadzenie prostej c **oraz** zapisanie poprawnej miary kątów co najmniej jednego z trójkątów APC lub BDP ,

LUB

poprowadzenie prostej PB lub AP **oraz** zapisanie poprawnej miary kąta odpowiadającego w trójkącie APC lub BDP ,

LUB

poprowadzenie prostej c **oraz** ustalenie miar kątów rozwartych CAP i PBE pięciokąta $ACEBP$,

LUB

poprowadzenie prostej c **oraz** zapisanie poprawnych miar kątów CAP i PBC czworokąta $ACBP$.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania


I sposób

Przez punkt P poprowadzimy prostą c równoległą do prostych a i b .

Dzieli ona kąt APB na dwie części, z których jedna jest kątem odpowiadającym do kąta o mierze 27° , a druga – do kąta o mierze 63° , zatem

$$|\sphericalangle APB| = 27^\circ + 63^\circ = 90^\circ.$$

Odpowiedź: Kąt APB ma miarę 90° .



II sposób

Przedłużmy półprostą PB do przecięcia z prostą a w punkcie C .

Ustalimy miary dwóch kątów w powstałych trójkątach APC lub BDP .

Jeden z kątów jest kątem wierzchołkowym, a drugi – kątem odpowiadającym do kątów o miarach odpowiednio 63° i 27° .

Obliczymy miarę trzeciego kąta w powstałych trójkątach APC lub BDP .


$$|\sphericalangle CPA| = 180^\circ - (27^\circ + 63^\circ) = 90^\circ$$

Kąt APB jest kątem przyległym do kąta CPA , czyli jest kątem prostym.

$$|\sphericalangle BPD| = 180^\circ - (27^\circ + 63^\circ) = 90^\circ$$

Kąt APB jest kątem przyległym do kąta BPD , czyli jest kątem prostym.

Odpowiedź: Kąt APB ma miarę 90° .

**III sposób**

Przez punkt P poprowadzimy prostą c prostopadłą do a i b . Wyznacza ona dwa trójkąty prostokątne APC i BEP .


Ustalimy miary kątów ostrych tych trójkątów:

$$|\sphericalangle CPA| = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ \quad \text{oraz}$$

$$|\sphericalangle BPE| = 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$$

$$|\sphericalangle APB| = 180^\circ - (27^\circ + 63^\circ) = 90^\circ$$

Odpowiedź: Kąt APB ma miarę 90° .



IV sposób

Poprowadzimy prostą c prostopadłą do prostych a i b tak, aby powstał pięciokąt wypukły $ACEBP$.

Ustalimy miary kątów rozwartych tego pięciokąta:


$$|\sphericalangle CAP| = 180^\circ - 27^\circ = 153^\circ \text{ oraz}$$

$$|\sphericalangle PBE| = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ$$

$$|\sphericalangle APB| = 540^\circ - (180^\circ + 117^\circ + 153^\circ)$$

$$|\sphericalangle APB| = 90^\circ$$

Odpowiedź: Kąt APB ma miarę 90° .

**V sposób**

Przez punkt A poprowadzimy prostą c prostopadłą do prostych a i b .

Wyznacza ona czworokąt $ACBP$.

Ustalimy miary dwóch kątów czworokąta:


$$|\sphericalangle PBC| = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ \text{ oraz}$$

$$|\sphericalangle CAP| = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$$

$$|\sphericalangle APB| = 360^\circ - (90^\circ + 117^\circ + 63^\circ)$$


$$|\sphericalangle APB| = 90^\circ$$

Odpowiedź: Kąt APB ma miarę 90° .



Zadanie 33. (0–3)

Trójkąt przedstawiony na rysunku jest ścianą boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.



Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Wymaganie szczegółowe


KLASY VII i VIII

XI. Geometria przestrzenna. Uczeń:

3) oblicza objętości ostrosłupów i pola powierzchni ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie są prawidłowe w zadaniach nie trudniejszych niż w przykładzie:

Prostokąt $ABCD$ jest podstawą ostrosłupa $ABCDS$, punkt M jest środkiem krawędzi AD , odcinek MS jest wysokością ostrosłupa. Dane są następujące długości krawędzi:

$AD = 10$ cm, $AS = 13$ cm oraz $AB = 20$ cm.



Oblicz objętość ostrosłupa.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia pola powierzchni całkowitej ostrosłupa, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką: $(64 + 16\sqrt{65})$ cm².

2 pkt – poprawny sposób obliczenia pola jednej ściany bocznej **oraz** poprawny sposób obliczenia pola podstawy ostrosłupa

LUB

poprawny sposób obliczenia wysokości ściany bocznej ostrosłupa tzn. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa **oraz** zapisanie, że pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest sumą pola kwadratu o boku długości 8 cm i pół czterech trójkątów o podstawie 8 cm.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia wysokości ściany bocznej ostrosłupa tzn. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

LUB

zapisanie, że pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest sumą pola kwadratu o boku długości 8 cm i pół czterech trójkątów o podstawie 8 cm

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązanie

Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, obliczymy wysokość h ściany bocznej ostrosłupa:

$$4^2 + h^2 = 9^2$$

$$h^2 = 81 - 16 = 65$$

$$h = \sqrt{65} \text{ (cm)}$$


Obliczymy pole ściany bocznej ostrosłupa:

$$P_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \sqrt{65} = 4\sqrt{65} \text{ (cm}^2\text{)}$$

Obliczymy pole powierzchni całkowitej ostrosłupa:

$$P = 8^2 + 4 \cdot 4\sqrt{65} = 64 + 16\sqrt{65} \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest równe $(64 + 16\sqrt{65}) \text{ cm}^2$.



Zadanie 34. (0–2)

Jaskinię Książęcą może zwiedzić codziennie tylko dziesięć grup. Każda grupa wchodzi osobno, a zwiedzanie trwa tyle samo minut. Pierwsza grupa rozpoczyna zwiedzanie o 9:00, a ostatnia grupa kończy zwiedzanie o 17:20. Grupa harcerzy przyszła zwiedzić jaskinię o godzinie 13:25.

**Oblicz, ile co najmniej minut harcerze będą czekali na wejście do jaskini.
Zapisz obliczenia.**

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XII. Obliczenia praktyczne. Uczeń:

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach.

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia minimalnego czasu oczekiwania na wejście do jaskini, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (35 minut).

1 pkt – poprawny sposób obliczenia czasu zwiedzania jaskini.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania**I sposób**

Od godziny 9:00 do 17:20 mija 8 godzin i 20 minut, czyli 500 minut.

W tym okresie jest 10 wejść do jaskini, więc jedno zwiedzanie trwa

$$500 : 10 = 50 \text{ minut.}$$

Od godziny 9:00 do 13:25 jest 265 minut, a ponieważ $265 = 5 \cdot 50 + 15$,
więc najbliższe wejście będzie za

$$50 - 15 = 35 \text{ minut.}$$

Odpowiedź: Harcerze będą musieli poczekać na wejście do jaskini co najmniej 35 minut.

II sposób

Od godziny 9:00 do 17:20 mija 8 godzin i 20 minut, czyli 500 minut.

W tym okresie jest 10 wejść do jaskini, więc jedno zwiedzanie trwa

$$500 : 10 = 50 \text{ minut.}$$

Kolejne wejścia do jaskini przypadają w godzinach:

9:00, 9:50, 10:40, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00.

Od godziny 13:25 do 14:00 jest 35 minut.

Odpowiedź: Harcerze będą musieli poczekać na wejście do jaskini co najmniej 35 minut.

Zadanie 35. (0–2)

Agnieszka zapisała liczbę czterocyfrową podzielną przez 7. Skreśliła w tej liczbie cyfrę jedności i otrzymała liczbę 496.

cyfra			
tysiący	setek	dziesiątek	jedności
4	9	6	X

Jaką liczbę czterocyfrową zapisała Agnieszka? Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową sposobem pisemnym, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach).

Zasady oceniania

2 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób wyznaczenia liczby czterocyfrowej podzielnej przez 7, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (4963).

1 pkt – stwierdzenie, że każdy ze składników sumy $4900 + 6x$ jest podzielny przez 7, **LUB** zapisanie dzielenia pisemnego bez wskazania wyniku działania.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania**I sposób**

Liczbę czterocyfrową zapisujemy jako $496x$, gdzie x oznacza cyfrę jedności.

Liczbę tę możemy zapisać w postaci sumy $4900 + 6x$.

Liczba 4900 jest podzielna przez 7.

Szukamy liczby dwucyfrowej podzielnej przez 7, której cyfra dziesiątek jest równa 6.

Przez 7 dzieli się tylko liczba 63.

Odpowiedź: Agnieszka zapisała liczbę 4963.

II sposób

Zapisujemy liczbę czterocyfrową w postaci $496x$, gdzie x oznacza cyfrę jedności i podzielimy ją przez 7.

Liczba dwucyfrowa $6x$ musi być podzielna przez 7, aby reszta z dzielenia była równa 0.


Stąd x musi być równy 3.

Odpowiedź: Agnieszka zapisała liczbę 4963.

	7	0	9		
4	9	6	x	:	7
4	9				
		6	x		
		6	3		
			0		

Zadanie 36. (0–3)

Prostokąt o bokach długości 12 i 6 podzielono na dwa prostokąty (zobacz rysunek). Obwód jednego z prostokątów otrzymanych w wyniku podziału jest 2 razy większy od obwodu drugiego prostokąta.



Oblicz wymiary prostokąta o mniejszym obwodzie. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Wymaganie szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

2) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia wymiarów prostokąta o mniejszym obwodzie, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy (6 i 2).

2 pkt – zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia długości krótszego boku prostokąta o mniejszym obwodzie

LUB

poprawny sposób obliczenia obwodu mniejszego prostokąta,

LUB

sprawdzenie wszystkich warunków zadania dla co najmniej dwóch różnych par długości boków większego i mniejszego prostokąta, w tym odpowiednio dla liczb:

10 i 2, ale bez podania wymiarów prostokąta o mniejszym obwodzie (metoda prób i błędów).

1 pkt – poprawny sposób oznaczenia długości dwóch boków otrzymanych prostokątów

LUB

stwierdzenie, że po przesunięciu linii podziału suma obwodów otrzymanych figur się nie zmieni,

LUB


dokonanie podziału prostokąta na dwa mniejsze prostokąty i obliczenie obwodów otrzymanych figur (metoda prób i błędów).

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Dzielimy prostokąt na dwa prostokąty. Dwa boki otrzymanych prostokątów oznaczamy tak, jak pokazano na rysunku.



Obwód mniejszego prostokąta jest równy:

$$2 \cdot x + 2 \cdot 6 = 2x + 12$$

Obwód większego prostokąta jest równy:

$$2 \cdot (12 - x) + 2 \cdot 6 = 36 - 2x$$

Obwód jednego prostokąta jest 2 razy większy od obwodu drugiego, co zapisujemy za pomocą równania.

$$36 - 2x = 2 \cdot (2x + 12)$$

$$36 - 2x = 4x + 24$$

$$6x = 12$$

$$x = 2$$

Odpowiedź: Prostokąt o mniejszym obwodzie ma wymiary 6 i 2.

II sposób

Dzielimy prostokąt na 2 kwadraty o obwodach 24.

Suma obwodów tych kwadratów jest równa 48.

Zauważmy, że jeśli przesuniemy linię podziału, suma obwodów otrzymanych figur się nie zmienia.

Łączny obwód szukanych prostokątów jest równy 48, stosunek tych obwodów jest równy 2 : 1.


Zatem obwód mniejszego prostokąta jest równy

$$48 : 3 = 16$$

Skoro jeden bok tego prostokąta jest równy 6, to drugi bok ma długość

$$\frac{16}{2} - 6 = 2$$

Odpowiedź: Prostokąt o mniejszym obwodzie ma wymiary 6 i 2.



III sposób

Dzielimy prostokąt na 2 kwadraty o obwodach 24.

Przesuwamy linię podziału i otrzymujemy dwa prostokąty.

W każdym z nich długość jednego boku zmienia się, a długość drugiego boku jest równa 6.


Sprawdzamy, jaki jest iloraz obwodów otrzymanych prostokątów.

większy prostokąt		mniejszy prostokąt		iloraz obwodu większego prostokąta do obwodu mniejszego prostokąta
długość jednego boku	obwód	długość jednego boku	obwód	
8	28	4	20	$\frac{28}{20} < 2$
9	30	3	18	$\frac{30}{18} < 2$
10	32	2	16	$\frac{32}{16} = 2$
11	34	1	14	$\frac{34}{14} > 2$

Odpowiedź: Prostokąt o mniejszym obwodzie ma wymiary 6 i 2.

Zadanie 37. (0–3)

Na okręgu o środku S i promieniu $r = 10$ cm zaznaczono punkty A i B , takie że $|AB| = 16$ cm. Następnie dorysowano odcinki AS i BS (zobacz rysunek).



Oblicz pole zielonej figury. Przyjmij $\pi \approx 3,14$. Zapisz obliczenia.

Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Wymagania szczegółowe

KLASY IV–VI

XI. Obliczenia w geometrii. Uczeń:

3) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek.

KLASY VII i VIII

XIV. Długość okręgu i pole koła. Uczeń:

3) oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy.

Zasady oceniania

3 pkt – pełne rozwiązanie: poprawny sposób obliczenia pola zacieniowanej figury, prawidłowe obliczenia **oraz** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką (≈ 266 cm²).

2 pkt – poprawny sposób obliczenia wysokości trójkąta ABS poprowadzonej z wierzchołka S tzn. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa **oraz** poprawny sposób obliczenia pola trójkąta ABS o podstawie 16 cm

LUB

poprawny sposób obliczenia wysokości trójkąta ABS poprowadzonej z wierzchołka S tzn. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa **oraz** poprawny sposób obliczenia pola koła o promieniu 10 cm,

LUB

poprawny sposób obliczenia długości wysokości trójkąta ABS poprowadzonej z wierzchołka S tzn. zastosowanie twierdzenia Pitagorasa **oraz** poprawny sposób obliczenia pola zacieniowanej figury jako różnicy pola koła o promieniu 10 i pola trójkąta ABS o podstawie 16 cm.

1 pkt – poprawny sposób obliczenia wysokości trójkąta ABS
LUB

zapisanie, że pole zacieniowanej figury jest różnicą pola koła o promieniu 10 cm i pola trójkąta ABS o podstawie 16 cm.

0 pkt – rozwiązanie błędne albo brak rozwiązania.

Przykładowe pełne rozwiązania

I sposób

Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, obliczymy wysokość trójkąta ABS :

$$8^2 + h^2 = 10^2$$

$$h^2 = 100 - 64 = 36$$

$$h = 6 \text{ (cm)}$$

Obliczymy pole trójkąta ABS :

$$P_{\Delta ABS} = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 6 = 48 \text{ (cm}^2\text{)}$$


Obliczymy w przybliżeniu pole koła o promieniu $r = 10$ cm:

$$P_{koła} = \pi \cdot 10^2 = 100\pi \approx 100 \cdot 3,14 \approx 314 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Obliczymy pole zacieniowanej figury:

$$P = P_{koła} - P_{\Delta ABS} \approx 314 - 48 \approx 266 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole zacieniowanej figury jest równe w przybliżeniu 266 cm^2 .



II sposób

Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, obliczymy wysokość trójkąta ABS :

$$8^2 + h^2 = 10^2$$

$$h^2 = 100 - 64 = 36$$

$$h = 6 \text{ (cm)}$$

Obliczymy pole zacieniowanej figury:

$$P = P_{koła} - P_{\Delta ABS} = \pi \cdot 10^2 - \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 6 \approx 314 - 48 \approx 266 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Odpowiedź: Pole zacieniowanej figury jest równe w przybliżeniu 266 cm^2 .

